



PREGUNTAS PARA EVALUAR SU ALERGIA A LA PENICILINA O A LA PENICILINA SIMILAR

Usted ha declarado que tiene una alergia a la penicilina o a la penicilina similar. Ahora se recomienda por parte de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología que todos los adultos con alergia a la penicilina o a la penicilina similar se sometan de manera proactiva a una evaluación de alergia. Más del 95% de los pacientes etiquetados como alérgicos a la penicilina o similares a la penicilina no son en realidad alérgicos, y el 80% de las personas pierden su alergia después de 10 años.

Este cuestionario nos ayudará a determinar si puede recibir de manera segura un antibiótico de penicilina o similar a la penicilina.

1. Hay 4 secciones para determinar su tipo de alergia a la penicilina.
2. Por favor, responda a cada pregunta eligiendo SÍ o NO.
3. Nombre del antibiótico alérgico _____ o escriba 'Desconocido'.

ESTO DETERMINARÁ SI TIENE UNA ALERGIA RARA Y SEVERA.

Paso 1

¿Tiene antecedentes de CUALQUIERA de las siguientes reacciones después de tomar un antibiótico de penicilina o similar a la penicilina? LA REACCIÓN PUEDE HABER OCURRIDO CASI INMEDIATAMENTE O HASTA VARIAS SEMANAS después de tomar el antibiótico. Por favor, marque 'Sí' o 'No' (o circule Sí o No si está impreso). (Los títulos a continuación son para el uso del proveedor de salud).

1. SJS/TEN

- | | | |
|---|----|----|
| • Erupción que se desarrolla en ampollas por todo su cuerpo | SÍ | NO |
| • Llagas en la boca | SÍ | NO |
| • Enrojecimiento de los ojos | SÍ | NO |

2. DRESS

- | | | |
|--|----|----|
| • Erupción en todo su cuerpo seguida de descamación de la piel | SÍ | NO |
| • Erupción con llagas en la boca, glándulas hinchadas, problemas hepáticos o renales | SÍ | NO |

3.	<u>AGEP</u>		
	• Llagas similares a ampollas, llenas de pus, de tamaño de un alfiler, que se propagan rápidamente por todo su cuerpo	SÍ	NO
4.	<u>SSLR</u>		
	• Erupción y dolores en las articulaciones	SÍ	NO
5.	<u>VASCULITIS</u>		
	• Erupción púrpura con daño renal o pulmonar	SÍ	NO
6.	<u>ORGAN SPECIFIC</u>		
	• Daño al hígado, riñones o recuento sanguíneo	SÍ	NO

Si la respuesta es **“SÍ”** a alguna(s) pregunta(s),

Paciente: Eres ALÉRGICO(A) SEVERAMENTE a la penicilina y a cualquiera de los antibióticos similares a la penicilina.

No debe tomar ningún antibiótico de penicilina ni similares a la penicilina hasta que sea evaluado por un médico o especialista de alergia.

****NO TIENE QUE RESPONDER NINGUNA OTRA PREGUNTA.****

Proveedor:

- No prescribir penicilina ni cefalosporina
- Referir a un alergólogo

Si la respuesta es **‘No’**, vaya a **Paso 2**.

Paso 2

ESTO DETERMINARÁ SI TIENE UNA ALERGIA SEVERA E INMEDIATA.

¿Tiene antecedentes de cualquiera de las siguientes reacciones ocurridas dentro de las primeras 6 horas después de tomar un antibiótico?

• Inicio repentino de dificultad para respirar, sibilancias, tos o sonido silbante agudo al tomar una respiración profunda	SÍ	NO
• Desmayado	SÍ	NO
• Erupción en todo el cuerpo con ronchas que pican	SÍ	NO
• Labios o lengua hinchados; opresión en la garganta	SÍ	NO
• Dolor abdominal o vómitos	SÍ	NO

Si la respuesta es “**SÍ**” a alguna(s) pregunta(s),

Paciente: Eres ALÉRGICO(A) SEVERAMENTE a la penicilina y a cualquiera de los antibióticos similares a la penicilina.

No debe tomar ningún antibiótico de penicilina ni similares a la penicilina hasta que sea evaluado por un médico o especialista de alergia.

****NO TIENE QUE RESPONDER NINGUNA OTRA PREGUNTA.****

Proveedor:

- No prescribir penicilina ni cefalosporina
- Referir a un alergólogo

Si la respuesta es ‘No’, vaya al **Paso 3**.

Paso 3

ESTO DETERMINARÁ SI NO ES ALÉRGICO.

¿Ha tenido alguna de las siguientes reacciones **NO ALÉRGICAS** a un antibiótico?

• Dolor de cabeza	SÍ	NO
• Diarrea, náuseas, vómitos o dolor abdominal	SÍ	NO
• Erupción plana sin ronchas	SÍ	NO
• Picazón sin erupción	SÍ	NO
• ¿Tiene antecedentes familiares de alergia a la penicilina?	SÍ	NO
• No sé o se me olvidó.	SÍ	NO

Si la respuesta es “**SÍ**” a alguna(s) pregunta(s),

Paciente: No eres ALÉRGICO(A) a la penicilina ni a ninguno de los antibióticos similares a la penicilina.

****NO TIENES QUE RESPONDER A NINGUNA OTRA PREGUNTA.****

Proveedor:

- El paciente puede recibir penicilina o cefalosporina

Si la respuesta es ‘No’, vaya al **Paso 4**.

Paso 4

ESTO AYUDARÁ A DETERMINAR SI USTED TIENE UNA ALERGIA TARDÍA (NO GRAVE) Y SI CORRE UN RIESGO BAJO AL TOMAR EL ANTIBIÓTICO.

Desde su reacción al antibiótico o desde su reacción a la penicilina?

Ampicillin	SÍ	NO
Amoxicillin	SÍ	NO
Amoxicillin/Clavulanate (Augmentin)	SÍ	NO
Cephalexin (Keflex)	SÍ	NO
Cefadroxil (Duricef)	SÍ	NO
Cefuroxime (Ceftin)	SÍ	NO
Cefaclor (Ceclor)	SÍ	NO
Cefixime (Suprax)	SÍ	NO
Ceftriaxone (Rocephin)	SÍ	NO
Penicillin - oral, injection	SÍ	NO
Cefdinir (Omnicef)	SÍ	NO

Si la respuesta es **“SÍ”** a alguna(s) pregunta(s),

Paciente: No eres ALÉRGICO(A) a la penicilina ni a ninguno de los antibióticos similares a la penicilina.

****NO TIENES QUE RESPONDER A NINGUNA OTRA PREGUNTA.****

Proveedor: • El paciente puede recibir penicilina o cefalosporina

Si la respuesta es ‘No’ o **“DESCONOCIDO”**, vaya al **Paso 5**.

Paso 5

¿Ha pasado más de 5 años desde la reacción o es desconocida?

SÍ

NO

Si 'SÍ',

Paciente: Es muy probable que no tenga una alergia a la penicilina o a antibióticos similares, o que la haya superado. Debe consultar con su proveedor de salud y no debe tomar este tipo de antibiótico hasta que sea evaluado.

****NO TIENE QUE RESPONDER NINGUNA OTRA PREGUNTA.****

Proveedor: Administrar un desafío con amoxicilina.

Si la respuesta es 'No' o "DESCONOCIDO", vaya al Paso 6.

Paso 6

¿Ocurrió la reacción más de 6 horas después de que su hijo recibió el antibiótico?

SÍ

NO

Si 'Si'

Usted tiene una alergia severa a la penicilina o a cualquier otro antibiótico similar

Paciente: Es muy probable que no tenga una alergia a la penicilina o a antibióticos similares, o que la haya superado. Debe consultar con su proveedor de salud y no debe tomar este tipo de antibiótico hasta que sea evaluado.

Proveedor: Administrar un desafío con amoxicilina.

Si 'No'

Paciente: Usted tiene una alergia severa a la penicilina o a cualquier otro antibiótico similar

No debe tomar ningún antibiótico de penicilina ni similares a la penicilina hasta que sea evaluado por un médico o especialista de alergia."

Proveedor:

- No prescribir penicilina ni cefalosporina
- Referir a un alergólogo