



PREGUNTAS PARA EVALUAR SU ALERGIA A LA PENICILINA O A LA MEDICAMENTOS SIMILARES A LA PENICILINA

Usted ha declarado que tiene una alergia a la penicilina o a la penicilina similar. Recibirá un antibiótico llamado cefazolina, que es un antibiótico similar a la penicilina, durante su cirugía para prevenir infecciones después de su cirugía. Ahora se recomienda por parte de la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología que todos los adultos y niños con alergia a la penicilina o a la penicilina similar se sometan de manera proactiva a una evaluación de alergia. Más del 95% de los pacientes etiquetados como alérgicos a la penicilina no son en realidad alérgicos y el 80% de las personas pierden su alergia después de 10 años.

Este cuestionario nos ayudará a determinar si puede recibir de manera segura el antibiótico similar a la penicilina, cefazolina, durante su cirugía. Está destinado únicamente a determinar su alergia a este antibiótico. Debe contactar a su proveedor de salud para la evaluación de su alergia a otros antibióticos penicilínicos o similares a la penicilina.

1. Hay 2 secciones para determinar su tipo de alergia a la penicilina.
2. Por favor, responda a cada pregunta eligiendo SÍ o NO.
3. Nombre del antibiótico alérgico _____ o escriba 'Desconocido'.

Paso 1

ESTO DETERMINARÁ SI TIENE UNA ALERGIA RARA, GRAVE, Y DE APARICIÓN TARDÍA.

¿Tiene antecedentes de CUALQUIERA de las siguientes reacciones después de tomar un antibiótico? La reacción puede haber ocurrido casi de inmediato o hasta varias semanas después de tomar el antibiótico.

Por favor, marque 'SÍ' o 'NO'

erupción en todo su cuerpo	SÍ	NO
• Ampollas	SÍ	NO
• Ronchas con picazón	SÍ	NO
• Llenas de pus	SÍ	NO
• Descamación de la piel	SÍ	NO
• Color púrpura	SÍ	NO
Llagas en la boca	SÍ	NO

Enrojecimiento de los ojos	SÍ	NO
Dolores en las articulaciones	SÍ	NO
Problemas hepáticos	SÍ	NO
Problemas renales	SÍ	NO

Si respondió ‘SÍ’

Paciente: a alguna pregunta, es **ALÉRGICO SEVERAMENTE** a la penicilina y a cualquiera de los antibióticos similares a la penicilina, y no recibirá cefazolina. Se le administrará un antibiótico alternativo

****DETENER - No necesita responder ninguna otra pregunta.****

Prestador: a alguna pregunta, es **ALÉRGICO SEVERAMENTE** a la penicilina y a cualquiera de los antibióticos similares a la penicilina, y no recibirá cefazolina. Se le administrará un antibiótico alternativo

Si respondió “NO”, vaya al **Paso 2**.

Paso 2

ESTO DETERMINARÁ SI TIENE UNA ALERGIA SEVERA E INMEDIATA.

¿Tiene antecedentes de cualquiera de las siguientes reacciones que ocurrieron dentro de las 6 horas después de tomar un antibiótico?

• inicio repentino de dificultad para respirar, sibilancias, tos o sonido silbante agudo al respirar.	SÍ	NO
• Desmayado	SÍ	NO
• Erupción en todo el cuerpo con ronchas que pican	SÍ	NO
• Labios, lengua o garganta hinchados	SÍ	NO
• Dolor abdominal o vómitos	SÍ	NO

Si respondió “SÍ” a alguna(s) pregunta(s), vaya al **Paso 3**.

Paso 3

¿Era el antibiótico cefazolina?

SÍ

NO/Unknown

Si respondió “**SÍ**”,

Paciente: No recibirás cefazolina. Se te dará un antibiótico alternativo.

Proveedor: Evita la cefazolina.

Si respondió “**NO**”,

Paciente: Recibirás cefazolina.

Proveedor: Administra cefazolina.